

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatu do czyszczenia jelit zawierający pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu Nr sprawy ZP 8.7/3/01/2017

Do wszystkich Wykonawców

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 wycenę 416,67 opakowań preparatu Makrogol **74 g x 48 saszetek**, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Przygotowanie do kolonoskopii jest procedurą, wymagającą stosowania odpowiedniej diety oraz skutecznych leków przeczyszczających. Bardzo dobry preparat przeczyszczający do przygotowania do kolonoskopii powinien być bezpieczny i zapewniać skuteczne oczyszczenie jelita grubego, nie wpływając na obraz makroskopowy i mikroskopowy. Leki obecnie stosowane powszechnie w przygotowaniu do kolonoskopii zawierają związki glikolu polietylenowego (PEG) popularnie nazywane makrogolami. Dużą wadą makrogoli jest dawkowanie wymagające przyjęcia w krótkim czasie dużej ilości preparatu (2000 - 4000 ml.) o charakterystycznym smaku oraz liczne działania niepożądane szczególnie nudności, wymioty, bóle brzucha. Z uwagi na powyższe, przygotowanie do kolonoskopii z wykorzystaniem makrogoli jest często źle tolerowane przez chorych w efekcie prowadząc do niewystarczającego oczyszczenia jelit. Substancje czynne pikosiarczan sodu i cytrynian magnezu mają działanie synergistycznie pikosiarczan sodu, środek przeczyszczający o działaniu stymulującym jelito grube oraz cytrynian magnezu, środek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Obie substancje działają miejscowo, nie wchłaniają się w wykrywalnym stężeniu z jelita. Efektem synergistycznego działania obu substancji czynnych jest silny „efekt wypłukujący” połączony ze stymulacją ruchów perystaltycznych. Dodatkowym potwierdzeniem jakości i skuteczności leku są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) z 2013 roku dotyczące przygotowania pacjentów do kolonoskopii, w których zaleca się połączenie pikosiarczanu sodu i cytrynianu magnezu jako alternatywę dla makrogoli.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Urszula Słowik